



En 4 års prospektiv studie av gravide kvinner i LAR og deres partnere. Rus og psykopatologi i graviditet og et år etter.

Ingunn Olea Lund
PhD student, Senter for rus – og avhengighetsforskning, Universitet i Oslo

Edle Ravndal
Professor, Senter for rus – og avhengighetsforskning, Universitet i Oslo

1

Bakgrunn

- ✓ Hvert år fødes ca. 30 barn av kvinner i legemiddelassistert rehabilitering (LAR)
- ✓ Rusmisbruk og psykiske problemer reduserer foreldres omsorgsevne. De fleste individer i LAR har hatt alvorlig problemer med bruk av flere stoffer i tillegg til heroin. Mange har også store psykiske problemer.
- ✓ Det er mangel på forskning som følger gravide kvinner i LAR og deres partners rusmisbruk og psykiske helse over tid (mens kvinnene er gravide og etter at barnet er født).

2

Problemstillinger

- ✓ Beskrive livstids rusbruk og psykopatologi hos en norsk 2-års kohort med gravide kvinner i LAR og deres partnere
- ✓ Undersøke rusbruk og psykiske problemer hos kvinnene og deres partnere mens kvinnene er gravide og etter at barna er født.

3

Materiale og metode

Materiale

- ✓ Gravide kvinner i LAR (n=37) og Norge og deres partnere (n=23) i 2005-2006.

Metode

- ✓ European Addiction Severity Index (EuropASI) kartlegger rus, fysisk og psykisk helse, arbeid, familie og sosiale relasjoner og rettslige problemer.

4

Resultater


Bakgrunn karakteristikk for studiepopulasjon

	Kvinner n=37	Menn n=23
Gjennomsnittsalder (range)*	32 (23-44)	36 (26-50)
I legemiddellassisert rehabilitering n (%)*	37 (100)	12 (52)
Familie og sosiale relasjoner n (%)		
Barn før studien (1-3 barn)	18 (49)	13 (56)
Daglig omsorg for barn	10 (57)	5 (39)
Vært i fengsel (tidligere i livet) n (%)	21 (57)	15 (71)
Overdose stoff (tidligere i livet) n (%)	26 (73)	8 (40)
Hepatitt n (%)	32 (87)	17 (74)



* Ved intervju i graviditet



5


Livstid prevalens rusmidler (%)



6







seraf
Senter for rus- og avhengighetsforskning

UNIVERSITETET
I OSLO

Diskusjon

- Hovedfunn
 - ✓ Livstids - prevalens av rusbruk blant kvinner i LAR og deres partnere viste tungt bruk av heroin og andre rusmidler i mange år før de begynte i LAR.
 - ✓ Både kvinnene og deres partnere hadde alvorlige psykiske problemer før LAR.
 - ✓ Lavt og stabilt rusbruk i graviditet og et år etter både for kvinnene og deres partnere.
 - ✓ Reduksjon i psykiske problemer blant både kvinner og menn
- Begrensinger
 - ✓ Lite materiale - risiko for type 2 feil.
- Styrker
 - ✓ Prospektivt design
 - ✓ 2års nasjonal kohort

12

Konklusjon

- ✓ Resultatene indikerer at majoriteten av kvinner i LAR i Norge og deres partnere klarer holde seg borte fra å bruke illegale stoffer gjennom graviditet og et år etter at barnet er født.
- ✓ Prevalens av psykiske problemer er sterkt redusert blant både kvinner og menn.
- ✓ Dette har sannsynligvis en positiv innvirkning på mødrene og deres partneres omsorgsevner.