

Forebygging av overdosedødsfall etter utskrivelse fra institusjon


I trygge hender
pasientsikkerhetsprogrammet.no



Med fokus på oss selv

- Redusere pasientskader
- Lage varige strukturer
- Utvikle god pasientsikkerhetskultur
- 2012 - mandat - usikker forskning-
overdose rapporter fra Oslo - Bergen -
Overdose teamet i Trondheim

Forebygging av overdosedødsfall etter utskrivning fra rusinstitusjon



Overdosekort

Ved overdose, ring ambulanse!

113

I trygge hender 24/7
pasientikkerhetsprogrammet.no

Overdose kan forebygges

Ved 3-8 dager uten stoff er toleransen lik null igjen

En reduserer risiko ved å dele opp i flere doser

Røyk er tryggere enn sprøyte

Det gir økt risiko å blande ulike stoffer

Overdose? Ring 113. Hold personen våken!

Start hjerte- og lungeredning hvis nødvendig 30-2-15

Ekstra viktig: Hold på til ambulansen kommer

Overdose? Call ambulance!

113

in Norway

In Safe Hands 24/7
pasientikkerhetsprogrammet.no

Overdoses are preventable

Very near zero tolerance after 3-8 days without drugs

Ensure reduced risk by dividing into smaller doses

Risk is lower when smoking compared to injecting

Drug mixing increases risk


Overdose? Call 113 (Norway). Keep the victim awake!

Start CPR if necessary 30-2-15

Extra important: Keep going until ambulance arrives

App for kriseplan -Min Plan Norge

- Pasientenes egen kriseplan
- For Iphone og Android
- Gratis tilgjengelig
- Norsk versjon utviklet av Sørlandet sykehus HF i samarbeid med Pasientsikkerhets-programmet
- Informasjonen eies av pasientene selv



Pasientsikkerhetskampanjen avdekket

- Manglende prosedyrer og manglende interesse
- Klinikker med tilfeldige straffetiltak
- Rigide strafferegimer
- Ukjent med pasientenes rettigheter
- Moralisme uten faglig tenkning

Oppslutning om tiltakene

- Praksisnært
- Meningsfylte for personalet og pasientene.
- Positivt og nyttig
- Synergieffekter
- Godt mottatt
- Oppleveres som meningsfullt og en ser at kampanjen kan redde liv.

Personalets opplevelse

- Kampanjen er godt mottatt
- Tiltakene oppleves som meningsfulle.
- Kampanjen kan redde liv.
- Ansatte er tryggere i forhold til å ta samtaler om overdosefare.
- Forebygging av overdosefare i system
- Motiverende å se systematiske resultater og grafer underveis.
- Kan observere om det er systematiske svikt som man bør gjøre en innsats for å forbedre.

Pasientenes opplevelse

- Givende å se responsen blant pasientene.
- HLR -stort engasjement og mange sitter igjen med følelsen av at de har lært noe nyttig.
- Tilbakemeldingen fra brukerne er at de føler seg tryggere på å gi HLR når de får praktisert.
- Vi oppnår økt kunnskap, trygghet, samspill og relasjonsbygging.
- Naloxon opplæring - ca 15 min

Har vi nådd målene som ble satt? Var det dette vi ønsket?

- Øker pasienters rettigheter !
- Bedre kvalitet i behandlingen? ja !
- Reduksjon av overdoser? Nei
- Flere overdoseutrykninger - bra eller dårlig!



Tusen takk for oppmerksomheten

